



A DOENÇA



É transmitida pelo carrapato-estrela infectado pela bactéria causadora da febre maculosa e pode ser grave.

SINTOMAS

Ocorrem de 2 a 14 dias após a picada do carrapato-estrela infectado.



Febre alta



Dor de cabeça



Dores no corpo



Dores abdominais



Manchas na pele



Náuseas e vômitos



**CASO TENHA ALGUM SINTOMA APÓS
FREQUENTAR ÁREAS DE RISCO,
PROCURE O SERVIÇO DE SAÚDE
E INFORME O OCORRIDO.
TRATAMENTO PRECOCE SALVA VIDAS.**

**MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE
VISAM - 4589-6340/6350 | VE - 4527-3856**

JUNDIAÍ
PREFEITURA



FEBRE MACULOSA

FIQUE DE OLHO PARA SE PREVENIR.

JUNDIAÍ
PREFEITURA



O CARRAPATO



Pode ser encontrado em áreas com acúmulo de folhas secas, matas, gramados e pastos, beira de lagoas, córregos e rios, principalmente em locais com a presença de capivaras, cavalos e animais silvestres.

O QUE FAZER SE ENCONTRAR UM CARRAPATO



Retire o carrapato calmamente com uma pinça, fazendo leves torções para não esmagá-lo.



Não esprema com as unhas.



Não use objetos aquecidos como: fósforos, cigarros, agulhas, etc.



Tome banho na sequência usando sabonetes ou xampus antiparasitários para humanos.



Caso tenha algum sintoma após frequentar áreas de mata ou pasto com carrapatos e/ou capivaras, ou após achar um carrapato no corpo, procure o serviço de saúde e diga ao médico que esteve em área com a presença desses animais.

COMO PREVENIR



Evite frequentar áreas com carrapatos e/ou capivaras.



Caso seja impossível evitar essas áreas, use roupas compridas e claras, e faça uma vistoria completa no corpo de tempos em tempos e após sair da área.



Não monte ou mantenha cavalos em áreas infestadas.



Procure um médico veterinário para receber orientações de como cuidar de seus animais domésticos com carrapatos.



LEMBRE-SE QUE ÀS VEZES O CARRAPATO NÃO É VISTO E A PICADA PODE NÃO SER PERCEBIDA.

TODAS AS FASES DO CARRAPATO-ESTRELA PODEM TRANSMITIR A DOENÇA.