FLUXO PARA ENCAMINHAMENTO - FRENECTOMIA

Protocolo singularizado para o Município de Jundiaí –
2025

Versão I

Prefeitura
de Jundiaí

FLUXO PARA ENCAMINHAMENTO - FRENECTOMIA

Preencher encaminhamento para referência de ODONTO FRENECTOMIA.

I. INDICAÇÕES PARA ENCAMINHAMENTO:

1. Frenectomia Lingual:

- Bebês com comprometimento das funções exercidas pela língua (sugar, engolir, mastigar e falar). Atenção às queixas de baixo ganho de peso;
- Em casos de recém nascidos com queixa de dificuldades na amamentação, fissuras ou dor mamária, baixo ganho de peso, inserir paciente em Odonto Frenectomia no sistema e encaminhar e-mail para regulacaosaudebucal@jundiai.sp.gov.br com os dados do encaminhamento e do paciente, solicitando urgência no agendamento;
- Crianças até 8 anos ou mais, com diagnóstico de anquiloglossia, que apresentem:
 - Dificuldade na fala
 - Comprometimento do posicionamento dentário.
 - Interferência na higiene oral, respiração ou alimentação.

2. Frenectomia Labial Superior:

Critérios para encaminhamento cirúrgico (frenectomia/frenotomia labial). A intervenção está indicada somente quando houver:

- Prejuízo na escovação dentária ou retenção alimentar frequente;
- Tração da gengiva marginal ou recessão gengival;
- Problemas ortodônticos associados e confirmados (por exemplo, diastema persistente após erupção total dos incisivos permanentes, com fechamento inviável por meios naturais);
- Interferência na fala, desde que avaliada e referenciada por equipe fonoaudiológica;
- Dificuldade em adaptação de próteses, em casos específicos.

Teste da linguinha

- Exame realizado para diagnosticar precocemente as limitações dos movimentos da língua causados pela anquiloglossia que podem comprometer as funções exercidas pela língua (sugar, engolir, mastigar e falar), comprometer o posicionamento dentário e indicar o tratamento;

- O protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês utilizado será o protocolo desenvolvido na Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (2015).¹
- Para que a função de sucção ocorra de maneira natural, o recém-nascido deve apresentar coordenação dos reflexos orais, vedamento labial e adequada movimentação e protrusão da língua, para obtenção do leite. A habilidade de distensão da língua é fundamental durante a extração do leite dos ductos mamilares, bem como os movimentos da mandíbula, o ritmo de sucção, as pausas alternadas e a coordenação entre movimentos de sucção, deglutição e respiração. Todos estes mecanismos são importantes para o sucesso da amamentação. As funções de sucção e deglutição dependem do correto funcionamento da língua².
- **Projeto de Lei nº 4832/12 □ Lei 13.002/2014:**
 - Art. 1 É obrigatória a realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, em todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências,
 - Art. 2 Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.
- Protocolo de avaliação do frênulo lingual com escores para bebês,
- Se não aferido na maternidade, poderá ser aferido na APS.

Protocolo:

- Triagem nas primeiras 48h de vida – Avaliação anatomofuncional
 - Pode ser realizado por profissional da área da saúde qualificado (pediatra, fonoaudiólogo, enfermeiro, cirurgião-dentista).

Passos:

- Posicionamento – Responsável apoia a nuca do bebê no espaço entre o braço e o antebraço. Em seguida é solicitado que ela segure as mãos do bebê.
- Elevação da língua (introdução dos dedos indicadores enluvados embaixo da língua, pelas margens laterais) para observação anatômica e observação funcional (choro, sucção)

- **Casos leves (escores 1-4)**
- **Casos inconclusivos (escore 5-6)**
 - Reteste com 30 dias de vida e orientação quanto a amamentação neste período
 - Reteste – É necessário que o bebê esteja bem acordado e com fome, próximo à hora da mamada, para que possa ser realizada a avaliação da sucção nutritiva.
 - Quando a soma das avaliações do Exame Clínico > 9, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.
 - Na avaliação geral do protocolo, quando a soma da história clínica e do exame clínico (escore de 0 a 25) for maior ou igual a 13, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua 1.
- **Casos severos (escore ≥ 7)** – Possível interferência do frênulo nos movimentos da língua e necessidade de cirurgia (Frenotomia lingual)

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO FRÊNULO DA LÍNGUA COM ESCORES PARA BEBÊS
Martinelli, 2013

EXAME CLÍNICO (sugere-se filmagem para posterior análise)

PARTE I – AVALIAÇÃO ANATOMOFUNCIONAL

1. Postura de lábios em repouso

() lábios fechados (0)

() lábios entreabertos (1)

() lábios abertos (1)

2. Tendência do posicionamento da língua durante o choro

() língua na linha média (0)

() língua elevada (0)

() língua na linha média com elevação das laterais (2)

() língua baixa (2)

3. Forma da ponta da língua quando elevada durante o choro

() arredondada (0)

() ligeira fenda no ápice (2)

() formato de "coração" (3)

Total da avaliação anatomofuncional (itens 1, 2 e 3): Melhor resultado= 0 Pior resultado= 6

Quando a soma dos itens 1, 2 e 3 da avaliação anatomofuncional for igual ou maior que 4, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO FRÊNULO DA LÍNGUA COM ESCORES PARA BEBÊS
Martinelli, 2013

4. Frênulo da língua

() é possível visualizar

() não é possível visualizar

() visualizado com manobra*

NO CASO DE NÃO OBSERVÁVEL VÁ PARA A PARTE II (Avaliação da Sucção não Nutritiva e Nutritiva)

4.1. Espessura do frênulo

() delgado (0)

() espesso (2)

4.2. Fixação do frênulo na face sublingual (ventral) da língua

() no terço médio (0)

() entre o terço médio e o ápice (2)

() no ápice (3)

4.3. Fixação do frênulo no assoalho da boca

() visível a partir das carúnculas sublinguais (0)

() visível a partir da crista alveolar inferior (1)

* Manobra de elevação e posteriorização da língua. Se não observável, fazer o acompanhamento.

Total da avaliação anatomofuncional (item 4): Melhor resultado= 0 Pior resultado= 6

Quando a soma do item 4 da avaliação anatomofuncional for igual ou maior que 3, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.

Total da Avaliação anatomofuncional (itens 1, 2, 3 e 4): Melhor resultado= 0 Pior resultado= 12

Quando a soma dos itens 1, 2, 3 e 4 da avaliação anatomofuncional for igual ou maior que 7, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO FRÊNULO DA LÍNGUA COM ESCORES PARA BEBÊS

Martinelli, 2013

PARTE II – AVALIAÇÃO DA SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA E NUTRITIVA

1. Sucção não nutritiva (sucção do dedo mínimo enluvado)

1.1. Movimento da língua

- () adequado: protrusão de língua, movimentos coordenados e sucção eficiente (0)
- () inadequado: protrusão de língua limitada, movimentos incoordenados e atraso para início da sucção (1)

2. Sucção Nutritiva na Amamentação

(na hora da mamada, observar o bebê mamando durante 5 minutos)

2.1. Ritmo da sucção (observar grupos de sucção e pausas)

- () várias sucções seguidas com pausas curtas (0)
- () poucas sucções com pausas longas (1)

2.2. Coordenação entre sucção/deglutição/respiração

- () adequada (0) (equilíbrio entre a eficiência alimentar e as funções de sucção, deglutição e respiração, sem sinais de estresse)
- () inadequada (1) (tosse, engasgos, dispneia, regurgitação, soluço, ruídos na deglutição)

2.3. “Morde” o mamilo

- () não (0)
- () sim (1)

2.4. Estalos de língua durante a sucção

- () não (0)
- () sim (1)

Total da avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva: Melhor resultado= 0 Pior resultado= 5

Quando a soma da avaliação da Sucção Não Nutritiva e Nutritiva for igual ou maior que 2, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.

Quando a soma do exame clínico for igual ou maior que 9, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.

TOTAL GERAL DA HISTÓRIA E DO EXAME CLÍNICO: Melhor resultado= 0 Pior resultado= 25

Quando a soma da história e do exame clínico for igual ou maior que 13, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.

Etapas do Protocolo		Itens a serem Avaliados (em negrito os dados que interferem no escore)	Escore	Interpretação
História Clínica		Data do exame, nome completo, gênero, data de nascimento, idade, endereço, telefone, nome dos pais, nome e grau de parentesco do informante, antecedentes familiares com alteração de frênulo lingual (sim= 1) , dados sobre a saúde geral atual do bebê, verificação de intercorrências durante a amamentação como tempo entre as mamadas (1h ou menos = 2) , cansaço para mamar (sim = 2) , se mama um pouco e dorme (sim = 1) , e se solta (sim = 1) ou morde (sim = 2) o mamilo.	0 a 8	Quando a soma dos itens da história clínica for igual ou maior que 4, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.
Exame Clínico	Avaliação Anatomofuncional	Observar aspectos gerais do frênulo da língua e uma avaliação das funções orofaciais para investigar os movimentos e a posição da língua na cavidade oral: 1 - Postura dos lábios em repouso: fechado = 0; lábios entreabertos = 1; lábios abertos = 1; 2 - Tendência do posicionamento da língua durante o choro: língua na linha média ou língua elevada = 0; língua na linha média com elevação das laterais ou língua baixa = 1; 3 - Forma da ponta da língua elevada durante o choro: arredondada = 0; ligeira fenda no ápice = 3; formato de "coração" = 3; e as funções de sucção e deglutição durante a amamentação: 4 - Frênulo da língua: se é possível visualizar ou não, ou se é possível visualizar com manobra. 4.1. Espessura do frênulo: delgado = 0, ou espesso = 2; 4.2. Fixação do frênulo na face sublingual (ventral) da língua: no terço médio = 0, entre o terço médio e o ápice = 2, no ápice = 3. 4.3. Fixação do frênulo no assoalho da boca: visível a partir das carúnculas sublinguais = 0, visível a partir da crista alveolar inferior = 1.	0 a 12	Quando a soma dos itens 1, 2 e 3 da avaliação anatomofuncional for igual ou maior que 4, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua. Quando a soma do item 4, que avalia a espessura do frênulo , foi igual ou maior que 3, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua. Quando a soma da avaliação anatomofuncional for maior ou igual a 7, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.
	Avaliação da Sucção Nutritiva e Não Nutritiva	Observa-se a avaliação da sucção não nutritiva, o movimento da língua (inadequado = 1), e; na avaliação da sucção nutritiva o ritmo (várias sucções seguidas com pausas curtas = 0, e poucas sucções com pausas longas = 1) e a coordenação na mamada (inadequada = 1) , assim como se a criança morde o mamilo (sim = 1) e se apresenta estalos de língua na sucção (sim = 1) .	0 a 5	Quando a soma da avaliação da sucção nutritiva e não nutritiva for igual ou maior que 2, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.

Tratamento:

- Pode ser realizado tanto pelo profissional odontólogo, como pelo médico,
- Encaminhamento via sistema para Odontologia Frenectomia.

Protocolo Frenectomia Labial Superior:

A fim de padronizar e qualificar os encaminhamentos para avaliação e possível intervenção cirúrgica do freio LABIAL superior em crianças, e considerando a literatura científica e os protocolos clínicos mais atualizados da odontopediatria, informamos as orientações a seguir:

1. Sobre o freio labial superior:

O freio labial superior é uma estrutura anatômica normal, cuja presença, espessura ou inserção não devem, por si só, ser consideradas indicativas de cirurgia. Estudos evidenciam que, em muitos casos, a inserção alta do freio labial em crianças pequenas pode sofrer modificações espontâneas com o crescimento, especialmente após a erupção dos incisivos permanentes e o fechamento fisiológico do diastema central.

2. Indicações clínicas para encaminhamento cirúrgico frenectomia/frenotomia):

De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Odontopediatria (SBO) e outras referências atuais da literatura, a intervenção cirúrgica está indicada somente quando houver:

- Interferência funcional significativa, como:
 - Prejuízo na escovação dentária ou retenção alimentar frequente;
 - Tração da gengiva marginal ou recessão gengival;
 - Problemas ortodônticos associados e confirmados (por exemplo, diastema persistente após erupção total dos incisivos permanentes, com fechamento inviável por meios naturais);
 - Interferência na fala, desde que avaliada e referenciada por equipe fonoaudiológica;
 - Dificuldade em adaptação de próteses, em casos específicos.

A presença de diastema interincisivo, isoladamente, em fase de dentição decídua ou mista, não configura indicação para cirurgia.

3. Idade ideal para avaliação definitiva:

A literatura recomenda que a reavaliação clínica do freio labial superior seja realizada após a erupção dos incisivos permanentes centrais e laterais, salvo situações de urgência ou impacto funcional importante.

4. Encaminhamentos para a rede especializada:

Solicita-se que os encaminhamentos sejam devidamente justificados em prontuário e no formulário de referência, com base nos critérios citados.

Referências bibliográficas:

- Martinelli, V. (2017). Teste da linguinha. Fonte: Teste da linguinha: <http://www.testedalinguinha.com/#/home> [Acessado dia 10/08/2020, às 18h].
- Detlinger, J. (2019 de Abril de 23). Paisefilhos. Fonte: Pais e Filhos: <https://paisefilhos.uol.com.br/familia/teste-da-linguinha-entenda-como-e-feito-e-para-que-serve-o-exame/> [Acessado dia 10/08/2020, às 18h].
- Neves, Ú. (02 de Maio de 2019). Pubmed. Fonte: Pubmed: <https://pubmed.com.br/teste-da-linguinha-pode-deixar-de-ser-obrigatorio/> [Acessado dia 10/08/2020, às 18h].
- Núcleo de Telessaúde Santa Catarina. (06 de Janeiro de 2016). APS BVS. Fonte: BVS Atenção Primária em Saúde: <https://aps.bvs.br/aps/qual-o-objetivo-quando-e-como-realizar-o-teste-da-linguinha/> [Acessado dia 10/08/2020, às 18h].
- Martinelli RLC, Marchesan IQ, Berretin-Felix G. Cartilha do Teste da Linguinha: para mamar, falar e viver melhor. São José dos Campos, SP: Pulso Editorial, 2014. Disponível em: http://www.sbfa.org.br/portal/pdf/testelinguinha_2014_livro.pdf [Acessado dia 03/05/2014, às 11h e 06min].
- BRASIL. Lei nº 13.002, de 20 de Junho de 2014. Obriga a realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13002.htm [Acessado dia 11/05/2015, às 20h e 11min].
- SILVA, Hewerton Luis, SILVA, Jairson José da, ALMEIDA, Luís Fernando de. Frenectomia: revisão de conceitos e técnicas cirúrgicas. SALUSVITA, Bauru, v. 37, n. 1, p. 139-150, 2018.
- ALMEIDA, Kleber Rosa de et al. Frenotomia lingual em recém-nascido, do diagnóstico à cirurgia: relato de caso. Rev. CEFAC, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 258-262, Apr. 2018. Available from:
- <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462018000200258 &lng=en&nrm=iso>. Access on 10 Aug.2020. <https://doi.org/10.1590/1982-0216201820212917>
- GOMES, Erissandra; ARAUJO, Fernando Borba de e RODRIGUES, Jonas de Almeida. Freio lingual: abordagem clínica interdisciplinar da Fonoaudiologia e Odontopediatria. Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent. [online]. 2015, vol.69, n.1, pp. 20-24. ISSN 0004-5276.
- ¹ Roberta Lopes de Castro Martinelli na Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de SP, sob a orientação da Professora Doutora Giédre Berretin-Felix.
- ² Sanches MTC. Manejo clínico das disfunções orais na amamentação. J Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Suppl):S155-62. <https://doi.org/10.1590/S0021-75572004000700007>.